

kupromeb

%22 Bakır (Cu)



ÜRÜN ADI	UYGULAMAZAMANI	DOZ (YAPRAKTAN)
ZEYTİN	1.uygulama: Hasat sonrası veya budama sonrası 2.uygulama: Çiçeklenmeden önce	500 gr. / 100 lt.su
FINDIK, CEVİZ, BADEM	1.uygulama: Kış periyodu boyunca/budamadan sonra 2.uygulama: İlkbaharda tomurcukların yeni kabardığı dönemde	500 gr. / 100 lt.su
ELMA, ARMUT, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ŞEFTALİ, KAYISI,	1.uygulama: Kış periyodu boyunca/budamadan sonra 2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukların yeni kabardığı dönemde	500 gr. / 100 lt.su
BAĞ	1.uygulama: Kış periyodu boyunca/budamadan sonra 2.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 20-30 cm'ye ulaştığında	500 gr. / 100 lt.su
NARENCİYE	Hasat sonrası maksimum 0.2 l/da uygulama Ağaçta çiçek veya meyve varken uygulama yapmayınız.	200 gr. / 100 lt.su
DOMATES, PATLICAN, BİBER	Dikimden 35 gün sonra (4-6 yaprak dönemi)	150 gr. / 100 lt.su
ANTEP FISTIĞI	1.uygulama: Meyvelerin buğday danesi kadar olduğu dönem 2.uygulama: İlk uygulamadan 15-20 gün sonra	500 gr. / 100 lt.su
PATATES	Tam yeşermeden 7-14 gün sonra ve yaprak analizini takiben yumru gelişimi sırasında uygulayınız.	500 gr. / 100 lt.su
ÇİLEK	Çiçeklenme öncesi erken sezonda uygulanır.	500 gr. / 100 lt.su
TAHİL	İki yaprak döneminde, ikinci boğum görüldüğünde ileri noksanlıklarda 15 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır. Sonbahar ekimlerinde kış soğuklarına girilmeden uygulama yapılması tavsiye edilir.	500 gr. / 100 lt.su
ÇİM	Baharda gelişme başlayınca uygulanır. İleri noksanlıklarda 15 gün aralıklarla tekrarlanır. Koyun otlatılan meralarda kullanmayınız.	500 gr. / 100 lt.su
TOPRAK UYGULAMASI	Dikim öncesi uygulanır. Çok yıllık bitkilerde gelişme öncesi uygulanır.	1000 gr. / 100 lt.su