

# mab-17

17-0-0 + 5 Zn



BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZ/ TOPRAKTA N	DOZ / YAPRAKTAN
Kiraz-Şeftali-Kayısı- Erik	Bitki yaprak oluşumunu tamamladıktan sonra	1-2 lt/da	100 cc/da veya 100 lt su ile
Elma-Armut	İlk uygulama çiçek açma döneminde, ikinci uygulama taç yaprakları döküldükten sonra	1-2 lt/da	50-100 cc/da veya 100 lt su ile
Fındık-Ceviz-Badem	Sürgün zamanı ve eksiklik durumunda	1-2 lt/da	200 cc/da veya 100 lt su ile
Zeytin	Çiçeklenme öncesi	1-2 lt/da	250 cc/da veya 100 lt su ile
Domates-Biber- Salatalık-Kabak	Erken dönemde ve noksanlık durumunda	1-2 lt/da	200 cc/da veya 100 lt su ile
Bağ	İlk uygulama tam çiçeklenmeden iki hafta önce, ikinci uygulama çiçeklenme ile meyve oluşumu arasında	1-2 lt/da	150 cc/da veya 100 lt su ile
Narenciye	İlkbahar sürgünleri 2/3 oranında uzadığında üç hafta arayla yapraklara püskürtülür	1-2 lt/da	100 cc/da veya 100 lt su ile
Antep fıstığı	Meyve oluşumundan 1 ay önce 10-15 gün arayla 2 kez	1-2 lt/da	150 cc/da veya 100 lt su ile
Hububat (Buğday- Arpa)	İlk uygulama sap uzama evresinde, ikinci uygulama birinci boğum oluşumunda	1-2 lt/da	200 cc/da veya 100 lt su ile
Mısır-Pamuk	5-7 yaprak öncesi ilk,15 gün sonra ikinci uygulama	1-2 lt/da	200 cc/da veya 100 lt su ile
Patates-Soğan- Havuç	Çiçeklenme öncesi	1-2 lt/da	100 cc/da veya 100 lt su ile
Lahana-Ispanak	5. yaprak açmadan önce uygulanır	1-2 lt/da	100 cc/da veya 100 lt su ile
Çilek	Erken dönemde ve noksanlık durumunda	1-2 lt/da	200 cc/da veya 100 lt su ile
Soya	Çiçeklenme öncesi	1-2 lt/da	200 cc/da veya 100 lt su ile
Kivi	Erken dönemde	1-2 lt/da	100 cc/da veya 100 lt su ile