

# COMBIMEB



	UYGULAMA ZAMANI	Doz/yapraktan gr/100 lt su ile	Doz/topraktan gr / da
SEBZELER	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
TARLA BİTKİLERİ	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
MEYVE AĞAÇLARI (Elma,armut,kiraz,şeftali,nar)	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
ÜZÜM VE BAĞLARDA	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
ZEYTİN	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
NARENCİYE	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
PAMUK	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
ŞEKERPANCARI, AYÇİÇEĞİ, MISIR	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
FINDIK,CEVİZ,BADEM	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
ÇİLEK	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
ÇİÇEKLER	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr	200-300 gr
<b>**Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar ve uygulama sıklığı tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumlarına göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Toprak ve /veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.</b>			