

Powermix-K

0-5-18 + 3MgO + ME



	UYGULAMA ZAMANI	Doz/yapraktan cc/100 lt su ile	Doz/topraktan lt / da
SEBZELER	Meyve tutumundan hasata 3 hafta kalana kadar	150-200 gr	300-400 gr
TARLA BİTKİLERİ	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	150-200 gr	300-400 gr
MEYVE AĞAÇLARI (Elma,armut,kiraz,şeftali,nar)	Meyve tutumundan hasata 3 hafta kalana kadar	250-300 gr	400-500 gr
ÜZÜM VE BAĞLARDA	Meyve tutumundan hasata 3 hafta kalana kadar	250-300 gr	400-500 gr
ZEYTİN	Meyve tutumundan hasata 3 hafta kalana kadar	250-300 gr	400-500 gr
NARENCİYE	Meyve tutumundan hasata 3 hafta kalana kadar	250-300 gr	400-500 gr
PAMUK	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	50-150 gr / da	200-300 gr
ŞEKERPANCARI, AYÇİÇEĞİ, MISIR	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	150-200 gr	300-400 gr
FINDIK,CEVİZ,BADEM	Meyve tutumundan hasata 3 hafta kalana kadar	250-300 gr	400-500 gr
ÇİLEK	Meyve tutumundan hasata 3 hafta kalana kadar	150-200 gr	300-400 gr
ÇİÇEKLER	Aktif gelişme dönemi boyunca veya ihtiyaç doğrultusunda	150-200 gr	300-400 gr

**Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar ve uygulama sıklığı tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumları arına göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir.
Toprak ve /veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.