

# mab amino fortis



BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	Doz/yapraktan cc/100 lt su ile	Doz/topraktan/ damlamadan cc/da
SEBZELER (Domates,biber,patlıcan,karpuz, çilek vb.)	Fide dikiminden10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 cc	500-1000 cc
ZEYTİN	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasat dönemine kadar 2-3 uygulama	150-200 cc	500-1000 cc
MEYVE AĞAÇLARI (Elma,armut,kiraz,şeftali,nar)	İlkbahar döneminden başlayarak hasat dönemine kadar 2-3 uygulama	150-200 cc	500-1000 cc
FINDIK, CEVİZ, BADEM	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasat dönemine kadar 2-3 uygulama	150-200 cc	500-1000 cc
BAĞ	Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	150-200 cc	500-1000 cc
TARLA BİTKİLERİ	Kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 uygulama	100-150 cc	-
PAMUK	Seyreltme işleminden sonra 2-3 uygulama	150-200 cc	-
ŞEKERPANCARI, AYÇİÇEĞİ, MISIR	Bitki boyu 10-15 cm ye ulaştığında 2 uygulama	100-150 cc	500-750 cc
NARENCİYE	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasat dönemine kadar 2-3 uygulama	150-200 cc	500-1000 cc
MUZ	Gelişme dönemi boyunca	150-200 cc	-
SÜS BİTKİLERİ	Fide dikiminden yada çiçek kesiminden itibaren gelişme dönemi boyunca	150-200 cc	500-1000 cc