

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
N-FOZİNC
3-20-0 + ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%w/w
Toplam Azot(N)	3
Üre Azotu (N-NH ₂)	3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Bor (Cu)	0,2
Suda Çözünür Çinko(Zn)	5

NET AĞIRLIK:

HACİM:

	UYGULAMA ZAMANI	Doz/yapraktan ml/100 L su ile	Doz/topraktan L / da
SEBZELER	Şaşırtmadan itibaren gelişme dönemi boyunca 10 gün ara ile	200-250	2-2,5
TARLA BİTKİLERİ	Aktif gelişme dönemi boyunca	150-200	2-2,5
MEYVE AĞAÇLARI (Elma ,armut, kiraz, şeftali, nar)	Gözlerin kabarmasından sonra, çiçeklenmeden önce	200-250	2-2,5
ÜZÜM VE BAĞLARDA	Gözlerin uyanma döneminde	150-200	2-2,5
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutum sonrası	200-250	2-2,5
NARENCİYE	Bahar sürgün gelişimi boyunca 10 gün ara ile	200-250	2-2,5
PAMUK	Tarak oluşumundan önce	150-200	2-2,5
ŞEKERPANCARI, AYÇİÇEĞİ, MISIR	Bitki boyu 10-15 cm olduğunda 10 gün ara ile	150-200	2-2,5
FINDIK, CEVİZ, BADEM	Çiçeklenmeden önce	200-250	100-125 ml /ocak
ÇİLEK	Şaşırtmadan itibaren vejetatif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	150 -200	2
KESME ÇİÇEKLER	Yetiştirme dönemi boyunca 2 kez	150-200	2

*Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına göre ve bitkilerin gelişme durumuna göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir ve ihtiyaç durumunda tekrarlanır.

*Çiçeklenme dönemindeyken uygulama yapılması tavsiye edilmez.

Parti No:
Ürt. Tar:

Tescil No:
Son Kull. Tar. :

Lisans No:

UYARILAR

- KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.
- SU İLE KARIŞTIRDIKTAN SONRA BEKLETMEDEN KULLANINIZ.
- Önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.
- Gübre tozlarını teneffüs etmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Boş ambalajlarla doğayı kirletmeyiniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Dikkat! Tahrîş edicidir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Direk gün ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda, +5 ile 30 °C sıcaklıkta saklayınız.
- Gübre, yanıcı ve patlayıcı özellikte değildir.
- Taşıma ve depolama esnasında ambalajların yırtılmamasına gayret gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK

- Diğer taban gübreleri, ilaçlar ve sıvı gübreler ile birlikte kullanmadan önce küçük bir kapta test edilmelidir.
- Ürünün yanlış kullanımı yüzünden doğabilecek olumsuz koşullardan firmamız sorumlu tutulamaz.

ÜRETİCİ FİRMA: MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Barış Mah. 1804 / 2 Sok. No:24 Gebze-Kocaeli

Tel:(262)6417710 Faks: (262)6465345

www.mebor.com.tr; www.mebgroup.com.tr

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ve taahhüt ederiz.

ŞİRKET MÜDÜRÜ

Tarih: ... / ... / 2024

EVREN KUMCU

