

meb ferro



ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	DOZ/YAPRAKTAN
SEBZE (AÇIK ALAN-SERA)	Dikimden 10 gün sonra 15 gün ara ile uygulanır.	100-150 cc/da
MEYVE AĞAÇLARI /NARENCİYE	Çiçek öncesi başlar ve 15 gün ara ile uygulanır.	150-200 cc / 100 lt su ile
FINDIK,CEVİZ, BADEM ..vb.	Yaprak oluştuktan sonra başlar ve 15 gün ara ile uygulanır.	150-200 cc / 100 lt su ile
BAĞ	Yaprak oluştuktan sonra başlar ve 15 gün ara ile uygulanır.	150-200 cc / 100 lt su ile
TARLA BİTKİLERİ (Arpa,Buğday,Nohut,Mercimek,Çeltik..vb.)	Aktif gelişme dönemi boyunca 15 gün ara ile uygulanır.	150-200 cc/da
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Mısır,Ayçiçeği,Patates,Şekerpancari,Pamuk..vb.)	Aktif gelişme dönemi boyunca 15 gün ara ile uygulanır.	150-200 cc/da
ÇİLEK	Meyve tutumundan sonra 10-15 gün ara ile uygulanır.	150-200 cc/da
PEYZAJ (ÇİM-ÇİÇEK..vb.)	Yetiştirme dönemi boyunca 20-30 gün ara ile uygulanır.	150-200 cc/da

****UYGULAMA SAYISI NOKSANLIK DERECESİNE GÖRE BELİRLENİR.**