

Suplex





Yüksek oranda Bor, Mangan, Çinko içeriği ile çiçeklenme ve meyve tutumu üzerinde olumlu etki yapar. Meyve ağaçları ve sebzelerde tutan meyvelerin aroma ve kalitesini artırır. Şekerpancarında şeker oranını ve verimi artırır, bor ile gövde öz çürüklüğüne engel olur. Bor, Mangan, Çinko noksanlığından meydana gelen kalite kayıplarını önler.

Garanti Edilen İçerik	: %w/w
Suda Çözünür Bor (B)	: 6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: 10
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 6

1
kg

5
kg

 BİTKİ	 UYGULAMA ZAMANI	DOZ / YAPRAKTAN GR / 100 LT SU İLE	DOZ / TOPRAKTAN DAMLAMADAN GR / DA
Şekerpancarı	4-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama	100 - 200 gr	300 - 500 gr
SERA VE AÇIK ALAN SEBZELERİ (Domates, biber, patlıcan, karpuz, kivircik, lahan, çilek vb.)	6 yaprak döneminden itibaren 10-15 gün aralıklar ile 2 uygulama	100 - 150 gr	300 - 400 gr
MEYVE AĞAÇLARI (Elma, armut, kiraz, şeftali, nar vb.)	Aktif gelişmenin başlaması ile birlikte 2-3 uygulama	200 - 300 gr	500 - 1000 gr
TARLA BİTKİLERİ (Mısır, Buğday, Arpa, Nohut, Mercimek vb.)	Kardeşlenme veya aktif gelişme döneminde ihtiyaç doğrultusunda	100 - 200 gr	300 - 400 gr
Zeytin	Aktif gelişmenin başlaması ile birlikte 2-3 uygulama	200 - 300 gr	500 - 1000 gr
Fındık, Ceviz, Badem	Aktif gelişmenin başlaması ile birlikte 2-3 uygulama	200 - 300 gr	500 - 1000 gr
Bağ	Çiçek salkımları görülmeye başladığında 10-14 gün aralıklar ile 2-3 uygulama	100 - 200 gr	400 - 500 gr
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır	4-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama	100 - 200 gr	300 - 500 gr